



【CBDCA+PTX+Pem-mab療法について】
(カルボプラチン+パクリタキセル+キイトルーダ療法)



様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
レスタミンコーワ錠	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服		5錠							5錠							5錠						
キイトルーダ注	200mg/body	30分																						
ファモチジン注	20mg	15分																						
デキサート注	6.6mg	30分																						
パロノセトロンバックアロカリス注	0.75mg/50mL 235mg	30分																						
パクリタキセル注	80mg/m ²	1時間																						
カルボプラチン注	1.5AUC	1時間																						

😊 **治療による副作用**

* アルコール過敏の方はお知らせください。

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
		4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
自覚症状	食欲不振・吐き気																								
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	筋肉痛・関節痛																								
		肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																							
	口内炎																								
	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																								
手足のしびれ																									
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。冷たい物に触れないようにしましょう。																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																									
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																								
検査値	白血球減少																								
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																								
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
	血小板減少																								
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																								
腎機能低下																									
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。																								
肝機能低下																									
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱
下痢 大腸炎	####
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれが 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱、空咳、がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

今治第一病院 薬剤部