



【EG療法について】
(エピルビシンNK+エンドキサン)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
ソラナックス錠	安定剤です	朝・夕 内服						1日目は、抗がん剤の投与開始前と夕～1回1錠飲んでください。																
ナウゼリンOD錠	吐き気止めです	朝・昼・夕食前内服						夕～1回1錠飲んでください。																
ムコスタ錠	胃薬です	朝・昼・夕食前内服																						
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・昼 内服						1回1錠																
アロカリス注 アロキシバック デキサート注	吐き気止めです	30分										この週はお休みです。												
エピルビシンNK注	90 mg/m ² (総投与量<900mg/m ²)	抗がん剤です	10分		尿の色が赤くなることがあります。																			
エンドキサン注	600 mg/m ²	抗がん剤です	60分																					

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/15
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000
 真泉会 今治第一病院 薬剤部