【HP療法について】
（ハーセプチン+パージェタ）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	用量	作用	めやすの時間	1日目 10/20 月	2 10/21 火	3 10/22 水	4 10/23 木	5 10/24 金	6 10/25 土	7 10/26 日	8 10/27 月	9 10/28 火	10 10/29 水	11 10/30 木	12 10/31 金	13 11/1 土	14 11/2 日	15 11/3 月	16 11/4 火	17 11/5 水	18 11/6 木	19 11/7 金	20 11/8 土	21 11/9 日	1日目 11/10 月
パージェタ注	初回：840 mg/Body 2回目以降：420 mg/Body	抗がん剤です	60分	2コース目から投与時間が短くなることがあります。																					
ハーセプチン注	初回：8 mg/kg 2回目以降：6 mg/kg	抗がん剤です	90分	2コース目から投与時間が短くなることがあります。																					
ボルタレン坐薬25mg		解熱鎮痛剤です	前処置（初回のみ）	1個 ボルタレン坐薬25mgは、発熱予防のため使用します。																					

この週は
お休みです。

この週は
お休みです。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目 10/20 月	2 10/21 火	3 10/22 水	4 10/23 木	5 10/24 金	6 10/25 土	7 10/26 日	8 10/27 月	9 10/28 火	10 10/29 水	11 10/30 木	12 10/31 金	13 11/1 土	14 11/2 日	15 11/3 月	16 11/4 火	17 11/5 水	18 11/6 木	19 11/7 金	20 11/8 土	21 11/9 日	1日目 11/10 月
自覚症状	アレルギー様症状																						
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	頭痛																						
		症状があるときはお知らせ下さい。																					

心機能低下（治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。）

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
＊何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

真泉会 今治第一病院 薬剤部