	【KAD療法について】
4577	(カドサイラ)



	コース目

☆ お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		めやすの	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18
薬の名前	作用	時間	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
カドサイラ注	3.6mg/kg	90分			2回目か なるこ	ら投与問 ことがあ ^り		Ī<					このお休	週は みです				N. C.		このお休	週はみです。			

	治療による副作用																	:注意7	が必要フ	な時期			
		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18
		火	水	木	金	<u>±</u>	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	アレルギー様症状				L .					L.,	<u> </u>	L .		<u> </u>	L	<u> </u>							
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	食欲不振・吐き気																						
	及め1級・生とス	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	口中火																						
自覚	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																					
	手足のしびれ																						
		手足の	しびれ	、感覚:	が鈍るス	などの症	上状がと	出ること	がありる	ます。冷	たい物	に触れ	ないよ	うにしま	しょう。								
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
		及其形		1700		01770	747,751			,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			HO			I .							
	鼻出血	息血と		しかたも	1-4-	レがあし	コキオ	10公円	 	かせる.	- レがは	<u>ا</u> ا ا	てさが	1041	上収ス/	ても止っても止って	士にか!	、担心!-	十二亩 绞 [ナノギー	/ 11		
		穿皿 (*	医区口	ише ж	2 - 9 -	∠13·00)°) 	1071 15	/уіс <u>іі</u> . Т	— шу⊘о	\ \		C 9 /J.	10/12	人 <u>工</u> 作: -	T COLL	みりない	'物口10	メ连州し	, (\/	- · · · ·		
	便秘	1.0.4	A	- ITT (I)		- 110 A	 																
		水分を	多めに	摂りまり	しよつ。ネ	続く場合	はお楽	どで調節	してト	さい。									I			1	
	白血球減少																						<u> </u>
		感染し	やすく	なります	ので、	手洗い	うがいを	と心がけ	ましょう	5。必要	に応じ	て白血	球数を_	上げる注	E射をす	-ること <i>t</i>	がありま	す。発	熱時は	お知らせ	せ下さい	١,	
+4	赤血球減少(貧血)																						
検 査	か皿・水火ツ(貝皿)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
値	布小七洋小																						
	血小板減少	出血し	やすく	なって手	足に赤	い点や	あざが	でたり、	歯ぐき	から血	が出たり	りするこ	とがあ	ります。	転倒に	注意し	ましょう。	0					
	DT 146 AL 147																						
	肝機能低下	体がだ	るい	・ 食欲が [・]	でない	皮膚の	かゆみ	▶ 皮膚	や白日	が番色	くなる.	とがあ	」 ります。	1		1						l .	

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

手や足のむくみ(治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。) **爪の変化**(爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。)

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000



- *注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。