



【VNR+PHES療法について】  
(ロゼウス+フェスゴ)



様


1 ー日目

☺ お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6
ボルタレン坐薬 25	解熱鎮痛剤です	前処置 (初回のみ)	1個																					火
フェスゴ皮下注	初回:フェスゴ皮下注IN 15mL 2回目以降:フェスゴ皮下注MA 10mL	抗がん剤です	8分																					火
デキサート注	6.6mg力価	過敏症を抑えるお薬です	15分																					火
ロゼウス注	25mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	5分																					火

2回目から投与時間が短くなる場合があります。(5分)

デキサート注には、血管痛予防としての作用もあります。



☺ 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	
自覚症状	血管痛・静脈炎																							火
	手足のしびれ																							火
	口内炎																							火
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							火
	アレルギー様症状																							火
	頭痛																							
検査値	白血球減少																							火
	赤血球減少(貧血)																							火
	肝機能低下																							火

点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。

手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。

口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。

髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。

発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。

症状があるときはお知らせ下さい。

感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。

貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。

体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000  
真泉会 今治第一病院 薬剤部