



【ddEC療法について】
(エピルビシンNK+エンドキサン)




様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 |
|----------------------------|---|-----------|------|-----|------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | | | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 |
| | | | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| ゾラナックス錠 | 安定剤です | 朝・夕 内服 | | | | | 1日目は、抗がん剤の投与開始前と夕～1回1錠飲んでください。 | | | | | | | | | | |
| ナウゼリンOD錠 | 吐き気止めです | 朝・昼・夕食前内服 | | | | | 夕～1回1錠飲んでください。 | | | | | | | | | | |
| ムコスタ錠 | 胃薬です | 朝・昼・夕食前内服 | | | | | | | | | | | | | | | |
| デカドロン錠 | 吐き気止めです | 朝・昼 内服 | | | | | 1回1錠 | | | | | | | | | | |
| アロカリス注 アロキシバグ デキサート注 | 吐き気止めです | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピルビシンNK注 | 90 mg/m ² (総投与量<900mg/m ²) | 抗がん剤です | 10分 | | 尿の色が赤くなることがあります。 | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン注 | 600 mg/m ² | 抗がん剤です | 60分 | | | | | | | | | | | | | | |



😊 **治療による副作用**

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 |
|------|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 |
| | | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出血性膀胱炎(血尿・排尿痛) | 水分を多めに取ってください。排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色素沈着 | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | |

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

😊 *** 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。**
* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

真泉会 今治第一病院 薬剤部
0898-23-2000