



# 【nab-PTX+Atez-mab療法について】

(アブラキサン+テセントリク)



様

 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	
テセントリク注	840 mg/Body	抗がん剤です	1時間	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
アロキシ注		吐き気止めです	30分																													
アブラキサン注	100 mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	30分																													

テセントリクはお休みです。

2コース目から投与時間が短くなる場合があります。(30分)

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
		4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	筋肉痛・関節痛																														
	口内炎																														
	手足のしびれ																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
	便秘																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														
	肝機能低下																														
発症時期不明	間質性肺炎																														
	下痢 大腸炎																														
	内分泌障害																														
	皮膚症状																														
	静脈血栓症																														
	重症筋無力症																														
	神経症状																														
I型糖尿病																															



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください  
0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部