【weeklyPTX+BV療法について】
（パクリタキセル+アバスチン）

様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 4/10 水	2 4/11 木	3 4/12 金	4 4/13 土	5 4/14 日	6 4/15 月	7 4/16 火	8 4/17 水	9 4/18 木	10 4/19 金	11 4/20 土	12 4/21 日	13 4/22 月	14 4/23 火	15 4/24 水	16 4/25 木	17 4/26 金	18 4/27 土	19 4/28 日	20 4/29 月	21 4/30 火	22 5/1 水	23 5/2 木	24 5/3 金	25 5/4 土	26 5/5 日	27 5/6 月	28 5/7 火	1日目 5/8 水
レスタミンｺｰﾜ錠	過敏症を抑えるお薬です	1日1回　内服	5錠							5錠							5錠														
ガスター注 デキサート注	6.6 mg力価	15分	デキサート注には、吐き気止めとしての作用もあります。																												
グラニセトロンﾊﾞｯｸﾞ		吐き気止めです	15分																												
パクリタキセル注	90 mg/㎡	抗がん剤です	1時間	アルコールが含まれています。							アルコールが含まれています。							アルコールが含まれています。													
アバスチン注	10 mg/kg	抗がん剤です	90分	2回目から点滴時間が短くなることがあります。(30分)							アバスチンはお休みです。																				

この週はお休みです。

治療による副作用

＊アルコール過敏の方はお知らせください。

：注意が必要な時期

		1日目 4/10 水	2 4/11 木	3 4/12 金	4 4/13 土	5 4/14 日	6 4/15 月	7 4/16 火	8 4/17 水	9 4/18 木	10 4/19 金	11 4/20 土	12 4/21 日	13 4/22 月	14 4/23 火	15 4/24 水	16 4/25 木	17 4/26 金	18 4/27 土	19 4/28 日	20 4/29 月	21 4/30 火	22 5/1 水	23 5/2 木	24 5/3 金	25 5/4 土	26 5/5 日	27 5/6 月	28 5/7 火	1日目 5/8 水
自覚症状	過敏症																													
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	食欲不振・吐き気																													
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	筋肉痛・関節痛																													
		肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																												
	口内炎																													
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
	手足のしびれ																													
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																												
	脱毛（頭髪・まつ毛・眉毛など）																													
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
	便秘																													
		水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節して下さい。																												
検査値	白血球減少																													
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																													
		貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少																													
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												
	肝機能低下																													
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなることがあります。																												

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●血圧上昇　●出血（鼻血など）　●タンパク尿　●胃腸穿孔（下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など）　●傷の治りが遅い

●血栓・塞栓（足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど）

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
＊何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください
0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部