




【CB療法について】 (カペシタビン+ベバシズマブ)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			6/26 火	6/27 水	6/28 木	6/29 金	6/30 土	7/1 日	7/2 月	7/3 火	7/4 水	7/5 木	7/6 金	7/7 土	7/8 日	7/9 月	7/10 火	7/11 水	7/12 木	7/13 金	7/14 土	7/15 日	7/16 月	7/17 火
ベバシズマブ注	7.5mg/kg	90分		2回目から点滴時間短くなることがあります。																				
カペシタビン錠	1000mg/m ² /回 1日2回	朝・夕 内服																						

1回 錠
(状態により変更になります)

☺ 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		6/26 火	6/27 水	6/28 木	6/29 金	6/30 土	7/1 日	7/2 月	7/3 火	7/4 水	7/5 木	7/6 金	7/7 土	7/8 日	7/9 月	7/10 火	7/11 水	7/12 木	7/13 金	7/14 土	7/15 日	7/16 月	7/17 火
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	手足のしびれ																						
	口内炎																						
	下痢																						
	手足症候群																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください
0898-23-2000

今治第一病院 薬剤部