



【FOLFIRI+P-mab療法について】 (5-FU+レボホリナート+カンプト+ベクティビックス)





様

| | |
|--|------|
| | コース目 |
|--|------|

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | | | | | | | | | | | | | | 2日目 | | | | | | | | | | | | | | 1日目 |
|------------------|------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| | | | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | |
| | | | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| ソラナックス錠0.4mg | 安定剤です | 前処置 | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| ベクティビックス注 | 6 mg/kg | 抗がん剤です | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| アロキシバグ デキサート注 | 9.9 mg力価 | 吐き気止めです | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| カンプト注 | 150 mg/m ² | 抗がん剤です | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| レボホリナート注 | 200 mg/m ² | 5-FUの効果を強める薬です | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| 5-FU注 | 400 mg/m ² | 抗がん剤です | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| 5-FU注(持続) | 2400 mg/m ² | 抗がん剤です | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| ソラナックス錠0.4mg | 安定剤です | 朝・夕 内服 | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| ナウゼリン錠 | 吐き気止めです | 毎食前 内服 | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |
| デカドロン錠 | 吐き気止めです | 朝・昼 内服 | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | ☯ | |

☺ **治療による副作用**

:注意が必要な時期

| | 1日目 | | | | | | | | | | | | | | 2日目 | | | | | | | | | | | | | | 1日目 | | |
|------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|--|
| | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | | 2/14 | |
| | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | | |
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色素沈着 | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など) | にきびのような発疹がでたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電解質異常(低マグネシウムなど) | 吐き気、脱力感、ふるえなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。治療の長期化でおこることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 息切れ ●空咳 ●不整脈



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000