



**【SOX+BV療法について】**  
(S-1+エルプラット+アバステン)



様  コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1日目																							
			1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31		
グラニセトロンパック			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
デキサート注	9.9 mg力価	吐き気止めです	15分																							
エルプラット注	130mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間																							
アバステン注	7.5mg/kg	抗がん剤です	90分																							
エスワンOD錠	体表面積1.25m <sup>2</sup> 未満: 初回基準量(テガフル相当量)40mg/回 体表面積1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満: 初回基準量(テガフル相当量)50mg/回 体表面積1.5m <sup>2</sup> 以上: 初回基準量(テガフル相当量)60mg/回	1日2回	抗がん剤です	朝・夕	内服																					
デカドロン錠		吐き気止めです	朝・昼	内服																						

この週はお休みです。

2回目から点滴時間が短くなる場合があります。(30分)

1回 2錠 (状態により変更になります)

1回1錠

☺ **治療による副作用**

注意が必要な時期

	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1日目																					
	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
自覚症状	過敏症	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																				
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																				
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																				
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																				
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出る場合はお知らせ下さい。																				
	手足症候群	手足がチクチクと痛い、赤く腫れる、ひび割れ、水疱が生じることがあるので、保湿剤を使い手足の乾燥を予防しましょう。																				
	色素沈着	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																				
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																				
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																				
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																				
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																				
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																				

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 流涙(目のかわき、痛み、かすみなど) ● 血栓・塞栓(足の腫れ・痛み、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000  
真泉会 今治第一病院 薬剤部