

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	用量	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
				4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2
グラニセトロンパッチ デキサート注	9.9 mg力価	吐き気止めです	15分	☒																					☒
エルプラット注	130 mg/m <sup>2</sup>	抗がん剤です	2時間	☒																					☒
エスワンOD錠	体表面積1.25m <sup>2</sup> 未満: 初回基準量(テガフル相当量)40mg/回 体表面積1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満: 初回基準量(テガフル相当量)50mg/回 体表面積1.5m <sup>2</sup> 以上: 初回基準量(テガフル相当量)60mg/回	抗がん剤です	朝・夕 内服		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
デカドロン錠		吐き気止めです	朝・昼 内服		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

この週はお休みです。

1回錠  
(状態により変更になります)

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	手足のしびれ																							
	口内炎																							
	下痢																							
	手足症候群																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 間質性肺炎(息苦しい、空咳、発熱など)
- 流涙(目のかわき、痛み、かすみなど) ● 胸痛、しびれ、気分が悪い、手足に力がはいらぬなど

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください  
0898-23-2000

\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。