



【CBDCA+PTX 療法について】

(カルボプラチン+パクリタキセル)



様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
薬の名前			11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
デキサート注	6.6mg 力価	15分																						
ファモチジン注	20mg																							
レスタミンコーワ錠	5錠	1回内服		5錠							5錠							5錠						
アロカリス注	235mg	30分																						
パロノセトロンパック	0.75mg/50mL																							
グラニセトロンバッグ	3mg/50mL	15分																						
パクリタキセル注	70mg/m ³	1時間		アルコールが含まれています。							アルコールが含まれています。							アルコールが含まれています。						
カルボプラチン注	5AUC	1時間																						
デカドロン錠	2錠 分2	朝・昼 内服																						
			腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。1.5~2L水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。																					

😊 治療による副作用

*アルコール過敏の方はお知らせください。

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	口内炎																						
		口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																					
	筋肉痛・関節痛																						
検査値	手足のしびれ																						
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																					
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																						
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																					
	白血球減少																						
検査値		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)																						
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	腎機能低下																						
検査値		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。																					
	血小板減少																						
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																					



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000