









【Atez-mab+BV療法について】 (テセントリク+ベバシズマブ)



さま

1 コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの 時間		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
					9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25
					木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
テセントリク注	1200mg/body	60分		<div>2回目から点滴時間が短くなることがあります。</div>							<div>この週はお休みです。</div>							<div>この週はお休みです。</div>								
アバスチン注	15mg/kg	90分																								

☺ 治療による副作用

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37. 5℃以上の発熱																					
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																					
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気																					
皮膚症状	発疹、かゆみなど																					
静脈血栓症	むくみや腫れ																					
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある																					
神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい																					
I 型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える																					

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください
0898-23-2000