



【Pem-mab+GC療法について】  
(イミフィンジ+ゲムシタピン+ランダ)



様

1

コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強に残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
イミフィンジ注	1500mg/body	1時間																					
パロノセトロンハック アロカリス注 デキサート注	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 力価	30分																					
硫酸マグネシウム液 生食	20mL 500mL	1時間																					
ランダ注	25mg/m <sup>2</sup>	2時間																					
ゲムシタピン注	1000mg/m <sup>2</sup>	30分																					
デカドロン錠4mg	1錠 分1	朝 内服																					

腎臓を保護するため、たくさん  
の輸液を点滴します。  
無理のない程度に水分補給を  
して、頻りに尿を出しましょう。

この週は  
お休みです。

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
😊 自覚症状	発熱																						
	食欲不振・吐き気																						
	血管痛・静脈炎																						
	口内炎																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	手足のしびれ																						
😊 検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	腎機能低下																						
	肝機能低下																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る時はお知らせ下さい。
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれが 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。