



**【Pem-mab+GC療法について】**  
**(キイトルーダ+ゲムシタピン+ランダ)**



様 1 コース目

**お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの時間		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
			12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25			
キイトルーダ注	200mg/body	30分	☒																								☒
パノセトロンパック アロカリス注 デキサート注	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 力価	30分	☒									☒															☒
硫酸マグネシウム液 生食	20mL 500mL	1時間	☒									☒															☒
ランダ注	25mg/m <sup>2</sup>	2時間	☒									☒															☒
ゲムシタピン注	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	☒									☒															☒
デカドロン錠4mg	1錠 分1	朝 内服		☒	☒	☒						☒	☒	☒													

腎臓を保護するため、たくさん  
の輸液を点滴します。  
無理のない程度に水分補給を  
して、頻繁に尿を出しましょう。

この週は  
お休みです。

**😊 治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
		12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25		
😊 自覚 症状	発熱	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																							
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	血管痛・静脈炎	点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																							
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																							
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍などの症状が出ることがあります。																							
😊 検査 値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
	腎機能低下	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																							
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																							

**以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。**

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれが 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください  
 0898-23-2000  
 真泉会 今治第一病院 薬剤部



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。