



【CPT-11療法について】 (カンプト)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	
グラニセトンパッグ デカドロン注	9.9 mg力価	吐き気止めです 15分	☒														☒															☒
カンプト注	150 mg/m ²	抗がん剤です 90分	☒			1回1錠				この週は お休みです。							☒														この週は お休みです。	☒
デカドロン錠		吐き気止めです 朝・昼 内服		☒	☒												☒	☒	☒													

😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4			
自覚症状																																
食欲不振・吐き気																																
食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																
下痢																																
便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																																
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
髪質が少し変わることもありますが、治療後半程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																
検査値																																
白血球減少																																
感染しやすくなりますので、手洗いうがいをおこなってください。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																
赤血球減少(貧血)																																
貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																
血小板減少																																
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部