



【G-SOX+Nivo-mab療法について】  
(S-1+エルプラット+オブジーボ)



様

コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
アルブラゾラム錠0.4mg	1錠	前処置																					
オブジーボ注	360mg/body	30分																					
アロキシ注パック	0.75mg/50mL																						
アロカリス注	235mg	30分																					
デキサート注	9.9mg 力価																						
エルプラット注	130mg/m <sup>2</sup>	2時間																					
エスワンOD錠	40~60mg/回	朝・夕 内服																					
ナウゼリンOD錠	3錠 分3	毎食前 内服																					
デカドロン錠	2錠 分2	朝・昼 内服																					

この週は  
お休みです。

治療による副作用

自覚症状	過敏症	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
	食欲不振・吐き気																					
	手足のしびれ																					
	口内炎																					
	下痢																					
	手足症候群																					
	色素沈着																					
	流涙																					
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																					
	白血球減少																					
	赤血球減少(貧血)																					
	血小板減少																					
	肝機能低下																					

:注意が必要な時期

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかつていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5°C以上の発熱
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください  
0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部